


# Схема взаимодействия МИС и СМП



## Передача вызова врача на дом

Взаимодействие проходит по следующей схеме:

1. СМП выбирает ЛПУ из списка.
2. Используя [метод создания вызова](#), сохраняет его в ЛПУ, передав вместе с вызовом данные пациента. Вызов поступает в ЛПУ со статусом "Предварительный"(Новый)
3. Сотрудники ЛПУ назначают на вызов врача.
4. СМП спустя определенное время(к примеру час) проверяет статус вызова, используя [метод получения вызова](#) и:
  1. В случае, если сотрудники ЛПУ обработали вызов - назначили на него врача и выбрали время, переводя его в статус "Активный" - СМП проставляет у себя статус "Принято в МО"(или любой другой, обозначающий успешное принятие вызова в МО).
  2. В случае, если сотрудники ЛПУ не обработали вызов - для него не назначен врач и он все еще в статусе "Предварительный"(Новый) - СМП отменяет вызов в ЛПУ [методом отмены](#) с пометкой "Не обработан вовремя" и забирает его обратно к себе в работу.

## Получение коечного фонда

Получение информации о коечном фонде проходит по следующей схеме:

1. СМП, используя [метод получения профилей лечения](#), уточняет код профиля "Скорая помощь"(Можно не уточнять каждый раз, а проверять в случае неполадок/периодически).
2. Информация о коечном фонде, сгруппированном по ЛПУ, получается с указанием кода профиля и, при необходимости, даты в [соответствующем методе](#).

## Получение медицинской информации о пациенте

Получение информации о пациенте проходит по следующей схеме:

1. СМП, используя [метод идентификации пациента](#) получает Идентификатор пациента - PersonGuid(Gip)
2. Для получения информации о пациенте используются методы раздела [Информация о пациенте для СМП](#)

## Передача информации о госпитализации пациента из СМП в МИС

1. СМП, используя [метод идентификации пациента](#) получает Идентификатор пациента - PersonGuid(Gip)
2. При направлении пациента на госпитализацию СМП использует метод [Передача данных госпитализации пациента из СМП в МИС - 114 форма](#)
3. В случае отказа от госпитализации СМП использует метод [Отказ от госпитализации из СМП](#)
4. Для уточнения статуса госпитализации пациента СМП использует метод [Получение госпитализации \(мед истории\) для СМП](#)

